

روتاویروس چه میکروبی است؟
شایع‌ترین علت بیماری‌های اسهالی در میان نوزادان و خردسالان است، اما بزرگسالان را نیز به ندرت تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چرا عفونت با روتاویروس یک مسئله سلامت عمومی است؟
روتاویروس عامل عفونت دستگاه گوارش است و یکی از رایج‌ترین علل اسهال در نوزادان و خردسالان در جهان به حساب می‌آید. علائم ابتلا به روتاویروس در کودکان معمولاً شدیدتر از بزرگسالان است. علاوه بر اسهال شدید، این ویروس باعث التهاب معده و روده شده و با استفراغ، تب، درد در ناحیه شکم همراه است که می‌تواند منجر به کم شدن آب بدن گردد.

علائم معمولاً حدود دو روز پس از قرار گرفتن فرد در معرض روتاویروس شروع می‌شود. استفراغ و اسهال آبکی می‌تواند سه تا هشت روز طول بکشد. علائم دیگر شامل از دست دادن اشتها و کم آبی بدن (از دست دادن مایعات بدن) می‌باشد که می‌تواند به ویژه برای شیرخواران و کودکان خردسال خطرناک باشد.

علائم کم آبی بدن عبارتند از:
کاهش ادرار، خشکی دهان و گلو، گریه با اشک کم یا بدون



واکسیناسیون نقش شگرف در سلامت جامعه دارد

واکسیناسیون یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که پدر و مادر برای سلامتی کودک خود انجام می‌دهند.

بیماری‌های عفونی خطرناک، دلیل فوت بسیاری از نوزادان و کودکان خردسال هستند. این در حالی است که به آسانی، با واکسیناسیون کودکان، می‌توانیم از ابتلای آن‌ها به این بیماری‌ها جلوگیری کنیم و آن‌ها را برای همیشه ایمن نماییم.

در حال حاضر واکسیناسیون از مرگ سه میلیون کودک در سال، در جهان جلوگیری می‌کند.

چه زمانی و در کجا واکسن بزنیم؟

کودکان در سن‌های مختلف بر اساس یک برنامه زمان‌بندی منظم به واکسن‌های مختلف نیاز دارند. در کشور ما، واکسیناسیون از زمان تولد نوزاد در زایشگاه یا بیمارستان شروع می‌شود. در تمام مناطق شهری و روستایی کشور ما، همه مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت، واکسیناسیون کودکان را بصورت رایگان انجام می‌دهند.

در این مراکز یک «دفترچه پایش مراقبت کودک» به والدین داده می‌شود که اطلاعات مهمی در مورد سابقه واکسیناسیون و نحوه رشد کودک در آن نوشته می‌شود و لازم است به دقت از آن نگهداری شود و در هر نوبت مراجعه به مرکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌ها یا خانه‌های بهداشت، والدین آن را به همراه داشته باشند.



ERROR: invalidfont
OFFENDING COMMAND: show

STACK: