

پشه های مهاجم آدس را بهتر بشناسیم



آدس اجیتی



آدس آلبویکتوس

۱- ویروس های دنگی، چیکونگونیا و زیکا از طریق گزش پشه آلوده آدس به افراد منتقل می شوند. این بیماری ها واکسن موثر و درمان قطعی ندارند.



۲- روزگز بودن (بیشترین گزش در هنگام طلوع خورشید و غروب آن می باشد).

۳- این پشه ها معمولا در ظروف نگهداری آب مانند: سطل زباله هایی که در آن آب جمع می شود، آبشخور حیوانات و پرندگان، زیرگلدانی ها و درون لاستیک های مستعمل تخم گذاری می کنند.



نکته: تخم در مقابل خشکی هوا مقاوم است و در محیط خشک تا ۴۴۰ روز زنده می ماند.

محافظت از گزش پشه آدس

- در خانه ها از تهویه مطبوع یا توری استفاده نمائید.
- لباس محافظ بپوشید: وقتی به مناطق دارای پشه می روید پیراهن آستین بلند ترجیحا به رنگ روشن، شلوار بلند، جوراب و کفش بپوشید.
- از مواد دافع پشه استفاده کنید: می توان روی لباس، کفش، وسایل کمپینگ استفاده کرد.
- زیستگاه پشه ها را کاهش دهید.
- پشه هایی که حامل ویروس دنگی هستند معمولا در خانه ها و اطراف آن زندگی می کنند و در آب های راکد پرورش می یابند.
- هر زباله که بتواند در آن آب جمع شود خطرناک می باشد.

هموطن گرامی:

شما می توانید با حذف زیستگاه هایی که پشه آدس در آن تخم می گذارد به کاهش جمعیت این پشه کمک کنید.